

接觸 結核

別 緊張



肺結核，是一種法定傳染病，會經由空氣傳播，如果不小心接觸肺結核病人，將由衛生所醫療人員追蹤關心且列為接觸者管理。



請配合「衛生所通知」
進行接觸者檢查即可

接觸者需配合事項

第一個關卡：胸部X光檢查

只需要帶著衛生所提供的轉介單，前往醫院告知醫師你有接觸史，配合胸部X光檢查，檢查報告若正常，就不需擔心。

第二個關卡：有條件性開放抽血檢驗丙型肝炎干擾素(簡稱IGRA)

通常是接觸者本身有免疫性疾病(糖尿病、腎臟病、使用免疫抑制劑、器官移植、愛滋感染者等)、接觸傳染性較強的結核病人或與肺結核病人共同居住，才需配合抽血檢驗。

感染跟發病差別在哪裡？

項目	潛伏結核感染	活動性肺結核(發病)
定義	體內有潛伏的結核菌，此時的結核菌在休眠期，也就是在「睡覺」，所以不會讓您覺得生病。	體內結核菌「醒來」，進入活動期並開始複製，此時您就會覺得生病
症狀	無	咳嗽、體重減輕、覺得疲憊、發燒、發寒或夜間盜汗等生病的感覺
傳染性	無，但終其一生會有 5-10% 機率變成結核病	有，通常藉由空氣、飛沫傳染給同一病室的家人或長時間接觸的朋友
胸部 X 光檢查	正常	浸潤、發炎
治療方式	<ul style="list-style-type: none"> • 服用 1-2 種藥物 • 傳統療程 (9 個月療程) • 短程療程 (3 或 4 個月療程) 	<ul style="list-style-type: none"> • 服用 3-4 種藥物 • 治療 6-9 個月或一年以上
治療副作用	較少	較多