



# 您不得不知道!!

## 威脅漸增的男性殺手

# 攝護腺癌

攝護腺癌(前列腺癌)在臺灣男性的癌症發生率第四名，大多發生在50歲以後的男性，但確診時，超過三成有遠處轉移，其主要還是攝護腺特異抗原(PSA)的篩檢率不夠普及。

### 攝護腺特異抗原(PSA)是甚麼?

PSA是攝護腺的正常分泌物，在癌症患者的血液中指數通常會升高，因此普遍用來作為攝護腺癌篩檢及攝護腺癌治療後的療效評估。

### 攝護腺癌篩檢(PSA)對象

- 45歲以上男性有攝護腺癌家族史者
- 50歲以上所有男性

### 攝護腺癌症狀

- 早期無明顯症狀
- 類似攝護腺肥大症狀，夜尿、頻尿、尿流變小、尿急、尿失禁、排尿困難、血尿等排尿問題

### 診斷方式

- 肛門指診+血清攝護腺特定抗原(PSA)
- PSA攝護腺切片檢查

### 治療方式

#### 早期

積極監測  
根治性攝護腺癌切除手術  
放射線治療(俗稱電療)

#### 遠端轉移

荷爾蒙去除治療法  
(雙側睪丸切除術或針劑注射法)  
或加上以下治療有效提供更好的疾病控制：

- ✓ 化學治療
- ✓ 標靶治療
- ✓ 局部的病灶手術切除
- ✓ 局部放射線治療



臺中榮總泌尿外科團隊 關心您的健康

有關攝護腺癌相關問題，建議進一步掛號諮詢泌尿外科醫師或洽  
04-23592525轉3258 陳淑妍個管師