


認識潛伏 結核感染



潛伏結核感染是指身體有結核菌存在，但結核菌處於「休眠狀態」，不會對身體造成攻擊或引發生病的症狀，也不具有傳染性傳播他人；但約有5-10%的風險轉變成有症狀、具有傳染性的結核病人，接受完整的潛伏結核感染治療可以降低90%發病風險，早期預防有助於保護自己及身邊親友！

如何確認是否為潛伏結核感染者？







當醫師評估您需要抽血檢驗丙型干擾素（簡稱IGRA），且IGRA檢驗報告呈現陽性或不確定結果時，代表身體可能有結核菌感染，需轉介到胸腔內科或感染科進一步評估。

潛伏結核感染者應如何治療？



潛伏結核感染治療以口服藥物為主，醫師會評估您的健康狀況及需求，選擇適合的治療處方：

療程	治療3個月	治療3個月	治療4個月	治療6個月
劑型				
頻次	每週吃一次	每日吃一次	每日吃一次	每日吃一次

※藥物劑量遵照體重計算，表格以60公斤病人為例

我們致力於與您一同守護健康，終結結核！

相關問題請洽詢結核病個案管理師 諮詢專線04-23592525分機83160、83161

臺中榮民總醫院 護理部與分枝桿菌中心 竭誠為您服務